

FUGLELIV PÅ TAUTRA

Verneområdet ble opprettet i 1984 for å bevare et viktig og artsrikt våtmarksområde. Fredningsbestemmelsene ble revidert i 2003, i forbindelse med verneplan for sjøfugl. Hele 227 fuglearter er observert innenfor verneområdet.

Strand, fjære og sjø i verneområdet er meget viktige rasteplasser for trekkende våtmarksfugl som gress, ender og vadere. Hele 227 fuglearter er observert innenfor verneområdet. I de mest hektiske trekkperiodene, vår og høst, kan tusenvis av fugler være samlet her. I trekktidene er også en lang rekke sjeldne fuglearter observert her.

Et stort antall fugler overvintrer, mest dykkender, men også lom, dykkere, skarv, stokkand, havørn og alkefugl. Både ærfugl og sjøorre bruker Svaet som myteområde mens svingfjærene felles midtsommers.

Moloen

Tautra har status som noe eksklusivt i bevisstheten hos naturinteresserte. Etter at det ble bygget en steinmolo fra Frostalandet til Tautra i 1976 gikk hekkebestanden av ærfugl tilbake fra ca. 1600 par til ca. 150 par i 2000.

Hovedårsaken var at en rekke rovdyr som mår, rev og grevling nå fikk lettere tilgang til øya over moloen. Disse tok både rugende hunner og egg, i tillegg til å skremme fuglene vekk fra reiret, slik at ungene ble sårbare for angrep fra stormåker.

Som en følge av at moloen stengte vanngjennomstrømmingen i Tautrasvaet, ble næringsforholdene for overvintrende (og hekkende) ærfugl og andre dykkender kraftig redusert. Det ble mye fokus på de dramatiske følgene av moloen. Etter trussel om å miste statusen som internasjonalt Ramsarområde, samt mye påtrykk fra naturvernere, ble det i 2002 startet et arbeid med å lage en åpning i moloen. Samtidig ble arbeidet med å hindre rovdyrs adkomst til øya intensivert.

Deler av moloen ut til Tautra ble erstattet med bru våren 2003, og i denne forbindelse ble det satt opp en port som skulle fungere som en rovviltssperre ut til øya. Dette resulterte i at bestanden av overvintrende dykkender økte raskt. Næringsforholdene i Svaet ble også raskt forbedret etter at vannet igjen fikk strømme fritt under brua. Hekkebestanden av ærfugl har imidlertid ikke klart å bygge seg opp igjen, og har de siste årene ligget på rundt 100 par. Siden hekkebestanden av ærfugl er så liten, representerer også katter, kråker, skjærer og fiskemåker en trussel mot bestanden.

Observer gjerne fuglelivet, men ikke forstyrr hekkende fugler!



Fiskemåke - *Larus canus*
Common Gull – **Sturmmöve**
Det finnes store kolonier av fiskemåke på Tautra. Hekkekolonier finnes blant annet på Åbåten, Storholmen og på innmark.



Fjæreplytt - *Calidris maritima*
Purple Sandpiper – **Meerstrandläufer**
Overvintrer i store antall, og er trekkgjester vår/høst. Ingen indikasjon på hekking på Tautra.



Gravand - *Tadorna tadorna*
Common Shelduck – **Brandgans**
Noen er kun trekkgjester, mens andre velger å hekke her.




Grågåås - *Anser anser*
Greylag Goose – **Graugans**
Et fåtall av fuglene overvintrer. Flere kommer innom som trekkgjester i vår-/høstsesongen. Noen hekker på Tautra.




Tjeld - *Haematopus ostralegus*
Oystercatcher – **Austernfischer**
Disse fuglene hekker i groper på bakken. De fleste er trekkgjester, mange hekker og kun et fåtall overvintrer her.



Gråstrupedykker - *Podiceps grisegena*
Red-necked Grebe – **Rothalstaucher**
De fleste er trekkgjester, men noen velger også å overvintrer her. Det er ikke registrert hekkende par av denne arten på Tautra.



Gulnebbblom - *Gavia adamsii*
Yellow-billed Loon – **Gelbschnabeltaucher**
De fleste individene man kan se tilbringer vinteren på Tautra. Et fåtall er også trekkgjester.



Havelle - *Clangula hyemalis*
Long-tailed Duck – **Eisente**
Denne fuglen overvintrer i store antall på Tautra, og enda fler kommer innom som trekkgjester på våren/høsten. Ingen indikasjon på hekking.



Hettemåke - *Larus ridibundus*
Black-headed Gull – **Lachmöwe**
Hekker i tusenvis ved Måsdammen. Kun et fåtall overvintrer, men ved vår-/høsttrekk finnes de igjen i tusentalls på Tautra.



Myrsnipe - *Calidris alpina*
Dunlin – **Alpenstrandläufer**
De fleste individene er trekkgjester, men et fåtall velger også å overvintrer. Det er ingen indikasjon på hekking.




Møller - *Sylvia curruca*
Lesser Whitethroat – **Klappergrasmücke**
Hekker på Tautra.



Rødstilk - *Tringa totanus*
Common Redshank – **Rotschenkel**
Brorparten av individene enten overvintrer eller er trekkgjester, men et fåtall hekker her.




Sjøorre - *Melanitta fusca*
Velvet Scoter – **Samtente**
Den største andelen av individene er trekkgjester. Noen bruker øya i myteperioden og til overvintring.



Skjeand - *Anas clypeata*
Northern Shoveler – **Löffelente**
De fleste individene er trekkgjester, men noen hekker.



Stokkand - *Anas platyrhynchos*
Mallard – **Stockente**
De fleste individene overvintrer eller kommer innom Tautra på vår/høsttrekk. Et 50-talls individer velger å hekke på øya.



Storlom - *Gavia arctica*
Black-throated Loon – **Prachttaucher**
Storlommen er trekkgjester på våren/høsten.



Storskarv - *Phalacrocorax carbo*
Great Cormorant – **Kormoran**
Overvintrer på Tautra, eller kommer innom under vår/høsttrekket. Det er ingen indikasjon på hekking hos denne arten på Tautra.



Svartand - *Melanitta nigra*
Common Scoter – **Trauerente**
Arten bruker øya under trekket og som myteplass.




Teist - *Cephus grylle*
Black Guillemot – **Gryllteiste**
Hekker under steiner på Åbåten. Et fåtall overvintrer også her.



Gråhegre - *Ardea cinerea*
Grey Heron – **Graureiher**
Denne arten overvintrer eller kommer til Tautra under trekket.



Vipe - *Vanellus vanellus*
Lapwing – **Kiebitz**
Hekker i et grasfjæret reir på bakken. Noen få par hekker her, men de fleste fuglene er kun innom Tautra som trekkgjester.



Ærfugl - *Somateria mollissima*
Common Eider – **Eiderente**
Hekker under steinheller, einerbuser eller i ærfuglhus, og er vanligst på nord- og sør-enden av øya. Varierende antall hele året.

Ærfugl - *Somateria mollissima*
Common Eider – **Eiderente**



Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag



FROSTA
KOMMUNE

